



به نام خدا



راهنمای دوشیدن شیر و نحوه نگهداری شیر دوشیده شده مادر

فهرست مطالب



- ✓ ضرورت دوشیدن شیر
- ✓ دفعات دوشیدن
- ✓ روش خوراندن شیر دوشیده شده
- ✓ آمادگی قبلی برای دوشیدن شیر / رفلکس اکسی توسین
- ✓ روش های دوشیدن
- ✓ روش ذخیره کردن
- ✓ جدول مدت زمان نگهداری شیر دوشیده شده
- ✓ روش ذوب کردن
- ✓ اثر یخچال، فریزر، جوشاندن بر عوامل حفاظتی و ترکیبات شیر
- ✓ دوشیدن و ذخیره کردن شیر برای نوزادان نارس

چه موقع نیاز است که شیرمادر دوشیده شود؟

- 
- ۱) به منظور تداوم تولید شیر در موارد:
 - جدایی مادر و شیرخوار به هر دلیل از چمله: مادران شاغل
 - بیماری مادر یا شیرخوار
 - استفاده مادر از برخی داروها
 - ۲) برای تغذیه نوزاد نارس یا کم وزن
 - ۳) برای نرم کردن هاله پستان در مواقع پری پستان
 - ۴) برای تسکین و رفع احتقان پستان و یا زمانی که یک یا چند مجرای شیر مسدود می شوند.
 - ۵) هنگام عدم توانایی شیرخوار برای گرفتن پستان
 - ۶) به منظور افزایش تولید شیرمادر در موارد کمبود شیرمادر
 - ۷) برای تشویق شیرخوار به گرفتن پستان (با دوشیدن کمی شیر در دهان او)
 - ۸) برای رفع نشت شیر
 - ۹) به منظور ذخیره کردن شیر در یخچال یا فریزر
 - ۱۰) برای اهداء به سایر مادران (که حتماً باید پاستوریزه شود).


دفعات دوشیدن شیر

بستگی به دلیل دوشیدن شیر دارد، مثلاً:

- ۱) نوزادی که قادر به مکیدن نیست: هر ۱ تا ۲ ساعت یک بار آغوز را باید با سرنگ ۲ سی سی مستقیماً از نیپل دوشید و به او خوراند.
- ۲) نوزادان کم وزن: هر ۲ تا ۳ ساعت یک بار
- ۳) هنگام بیماری مادر یا شیرخوار: هر ۳ ساعت یک بار
- ۴) برای افزایش تولید شیر: هر ۲ تا ۳ ساعت یک بار حداقل ۶ بار در روز و یک بار در شب (کل زمان دوشیدن شیر در شبانه روز کمتر از ۱۰۰ دقیقه نباشد).

مطلوب است بهداشت






۵) در مورد احتقان پستان: هر چندبار و هر مقدار شیر که سبب تسکین مادر شود.

(اول شیر را با دست بدوشند تا مادر احساس راحتی کند بعد با پمپ دوشیده شود).

۶) برای نشت شیر: آن مقدار که فشار داخل پستان کاهش یابد.

۷) مادران شاغل: هر ۳ یا ۴ ساعت یک بار (در محل کار)

روش های خوراندن شیر دوشیده شده مادر



- گاواژ: برای نوزادان نارس برای نوزادانی که قادر به مکیدن نیستند.
- با سرنگ، قاشق یا قطره چکان: در چند روز اول توّلد
- با فنجان: وقتی حجم شیر دریافتی نوزاد حداقل به ۱۰ سی سی برسد.

معاونت بهداشت

آمادگی قبلی برای دوشیدن شیر تحریک رفلکس اکسی توسین

- ✓ نشستن در یک محیط آرام و خلوت، محل راحت در کنار شیرخوار و یا تصویر او
- ✓ در صورت امکان پرقراری تماس پوست با پوست با شیرخوار
- ✓ نوشیدن یک نوشیدنی گرم (به جز قهوه)
- ✓ گرم کردن پستان با کمپرس گرم یا دوش گرفتن
- ✓ ماساژ پستان

معاونت بهداشت




❖ روش های ماساژ پستان:

۱- غلطاندن مشت بسته به روی پستان


۲- ضربه ملایم به پستان با نوک انگشتان یا
شانه

۳- ماساژ پستان به روش دودستی
(از فشار و مالش شدید خودداری کنید.)

۴- تحریک نوک پستان با گرفتن آن با انگشت
شست و سبابه



۵- ماساژ پشت مادر




روش های دو شیپن شیر

۱) بـا دـست

۲) با شیردوش:

- ▶ شیر دوش (پمپ) های دستی
 - ▶ شیر دوش های الکتریکی (باطری - برقی: تکی یا دوبل)



نکات مهم در دوشیدن شیر

روش دوشیدن با دست:

ساده ، آسان ، راحت و روشی مؤثر در یکی دو روز اول بعد از تولد برای جمع آوری آغوز است.

دوشیدن با پمپ دستی:

تولید ساکشن کمتر در مقایسه با پمپ الکتریکی


- ▶ شیردوشی برای کوتاه مدت

- ▶ خلاء حاصل از ایجاد فشار منفی را هر چند ثانیه یک بار باید قطع کرد تا از صدمه به نسج پستان پیشگیری شود .

معاونت بهداشت



دوشیدن با پمپ الکتریکی:

- 
 - ریتم متناوب دارد .
 - سهولت سرهم کردن قطعات
 - سهولت در شستشو و ضد عفونی کردن
 - مؤثر برای دوشیدن شیر به مدت طولانی
 - دوشیدن شیر همزمان از هر دو پستان
 - جمع آوری شیر بیشتر در زمان معین
 - اگر با ماساژ پستان هم همراه باشد حجم و چربی شیر دوشیده شده بیشتر خواهد بود .





دوشیدن با دست

کاربرد این روش:

- * دوشیدن شیر در روزهای اول برای نوزادان نارس
- * جدایی کوتاه مدت مادر و شیرخوار
- * احتقان پستان
- * **Sore Nipple**

معاونت بهداشت

راهنمای دوشیدن شیر با دست



الف →

▶ اول پستان را به طرف قفسه سینه فشار دهید و سپس به کمک شست و انگشتان، پستان را به طرف جلو بیاورید و به لب آرئول فشار دهید تا شیر خارج شود (فشار بر سینوس های شیری و مجاری شیر).

۱) دست هایتان را کاملا بشویید.


۲) قبل از دوشیدن شیر، از یک یا چند روش تحریک رفلکس اکسی توسین استفاده کنید.

۳) دستان را روی پستان طوری قرار دهید که چهار انگشت زیر لبه هاله، و شست ۳ سانتیمتر دورتر از قاعده نوک پستان باشد (لمس سینوس ها و مجاری شیر).



► دست را در تمام جهات آرئول بگذارید تا همه سینوس های لاكتی فروس که شیر را ذخیره می کنند تخلیه شوند.

(با این روش برای دوشیدن شیر کافی از هردو پستان، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه وقت لازم است.)



توجه:

✓ هیچگاه نوک پستان را فشار ندهید.

✓ به نسج پستان صدمه نزنید.

مددگاری مادر و نوزاد

(فشار دادن و چلاندن پستان صحیح نیست)

دوشیدن شیر با پمپ (شیردوش)

أنواع:



از پمپ های شبیه بوق دوچرخه استفاده نکنید.



❖ شیردوش های الکتریکی (برقی) که در منزل و تکی یا دوبل هستند.
❖ شیردوش های الکتریکی (برقی) که در منزل و یا بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرند:

کاربرد این روش:

مادرانی که:


- * باید مرتب شیرشان را بدوشند.
- * باید به سر کارشان برگردند.
- * دارای شیرخوار بیمار و یا نارس هستند.
- * نوزاد پرترم آنان در NICU بستری است (Pump dependent mothers).

شیردوش های NICU باید بسیار مؤثر، کارآمد، راحت و همیشه در دسترس باشند.

متخصصین شیردهی شاغل در NICU باید:

- به این مادران کمک کنند.
- بهترین شیردوش ها را فراهم نمایند.
- طرز کار با شیردوش را به مادران آموزش بدهند.

چه پمپی مناسب تر است؟




معاونت بهداشت

راهنمای استفاده از شیردوش های برقی

-
- ۱) قبل از دوشیدن شیر دستها را بشوئید.
 - ۲) قبل از دوشیدن شیر همچنین در فاصله دوشیدن ها، پستان ها را ماساژ دهید.
 - ۳) لازم نیست که چند میلی لیتر اول شیر را دور بریزید.
 - ۴) ۱۰ دقیقه دوشیدن هر پستان کافی است. بهتر است که هر دو پستان با هم دوشیده شوند.
 - ۵) در بیمارستان، هر کیت شیردوش برای استفاده یک مادر است مگر، وسایل آن استریل شود.
 - ۶) شیردوش های مورد استفاده در منزل اگر فقط توسط مادر استفاده می شود نیازی به استریل کردن ندارد (شستشو کافی است).
 - ۷) شیردوش های مورد استفاده نوزادان بیمار یا نارس باید استریل شوند.

طرز کار با شیردوش های برقی

- طرز دوشیدن شیر باید مانند مکیدن کودک باشد یعنی یک مکش در ثانیه یا ۶۰ مکش در دقیقه
 - پمپ هایی بهتر عمل می کنند که مشابه حرکات پریستالتیک زبان عمل کنند و دارای فشار مثبت و منفی باشند.
 - فشار پمپ نباید از ۲۵۰ میلی لیتر جیوه تجاوز کند.
 - فشار کمتر از ۱۵۰ و بیش از ۲۵۰ میلی لیتر جیوه هیچگدام مناسب نیستند.
- معاونت بهداشت
- 



- در ابتدا با حداقل فشار شروع کنید، سپس به تدریج فشار را زیادتر نمایید تا به حد مجاز برسد.
 - سعی کنید نوک پستان کاملا در وسط قیف شیردوش قرار بگیرد.
 - برای پستان های کوچک از پمپ های با قیف کوچک تر و برای پستان های بزرگ از پمپ های با قیف بزرگ تر استفاده نمایید.
 - در صورت احساس ناراحتی هنگام دوشیدن شیر، روش دوشیدن را کنترل کنید.
 - روش شستشو و تمیز کردن وسایل پمپ در ورقه راهنمای ذکر شده است.
- ## معاونت بهداشت

مزایای شیردوش های الکتریکی دوبل

- چون هم‌مان شیر هر دو پستان را تخلیه می کند با افزایش بیشتر سطح پرولاکتین و تولید بیشتر شیر همراهند.
- ترکیب شیری که با عمل دوشیدن از پستان خارج می شود با ترکیب شیری که خود به خود و با رفلکس جهش شیر خارج می شود متفاوت است.
- چون با پمپ الکتریکی تقریباً تمام شیر خارج می شود چربی بیشتر و درنتیجه کالری بیشتری دارد و برای تغذیه نوزادان نارس بسیار مفید است.
- از طرف دیگر سدیم بالای این شیر، دفع زیاد سدیم ادرار این نوزادان را جبران می کند و افزایش وزن آنان را از ۱۳ گرم به ۱۳ تا ۲۱ گرم در هر کیلوگرم می رساند.

معاونت بهداشت

نحوه نگهداری شیر دوشیده شده مادر

کلیات:

- ▶ شیرمادر باید در یک مکان خنک و مناسب دوشیده و ذخیره شود تا حفاظت آن حداقل و آلوگی آن حداقل باشد.
- ▶ هنگام دوشیدن شیر، برخی میکروب های پوست به آن اضافه می شود.
- ▶ مواد ایمنی بخش موجود در شیرمادر، آن را از آلوده شدن حفظ می کند.
- ▶ مطالعات نشان داده اند: نگهداری شیر در حرارت مناسب اتاق (کمتر از ۲۵ درجه) و یا در یخچال (۴ درجه یا کمتر) به مدت ۸ ساعت، از نظر میکروب های شیر اختلاف قابل توجهی ندارند.
- ▶ نگهداری شیرمادر در دمای بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد روش مطمئنی نیست و نگهداری شیر در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد اصلاً توصیه نمی شود.



➤ محققین عقیده دارند:

اگر شیر دوشیده شده مادر حداقل طی ۵ روز استفاده می شود بهتر است در یخچال نگهداری شود تا در فریزر.


➤ شیر تازه دوشیده شده را اول یک ساعت در یخچال بگذارید، سپس می توانید آن را به شیری که طی همان روز دوشیده و در یخچال گذاشته اید، اضافه کنید.

➤ شیر دوشیده شده هر روز را جدا از شیر دوشیده شده روزهای دیگر نگهداری کنید.

➤ تاریخ دوشیدن شیر را بر روی یک بر چسب ضد آب بنویسید و روی ظرف شیر بچسبانید.

➤ برای محافظت بیشتر، بهتر است ظرف ذخیره شیر را در مجاورت با یک تکه یخ خشک قرار دهید.

معاونت بهداشت

- 
- برای فریز کردن، سه چهارم ظرف را پر کنید تا جای یخ زدن داشته باشد.
 - مناسب ترین مقدار شیر برای فریز کردن ۳۰ تا ۶۰ حداکثر ۱۲۰ میلی لیتر است.
 - شیر گرم تازه دوشیده شده را به شیرهای فریز شده قبلی اضافه نکنید.
(سبب ذوب نسبی شیر فریز شده و کاهش عوامل حفاظتی آن می شود)
 - شیرهای دوشیده شده قدیمی را زودتر به کار ببرید.
 - اگر شیر دوشیده شده را به مهد کودک می سپارید نام کودک را نیز روی برچسب آن بنویسید.

معاونت بهداشت

رعایت بهداشت و انتخاب ظرف

▶ شستشوی دست با آب و صابون

▶ شستشوی ظروف و جوشاندن آن‌ها به ۲۰ تا ۲۵ دقیقه

انتخاب ظرف

▶ استفاده از ظروف شیشه‌ای بر سایر ظروف ارجح است.

- دومین انتخاب، ظروف پلاستیک سخت شفاف

- انتخاب سوم ظروف پلاستیک سخت غیر شفاف است.

- و چهارمین انتخاب ظروف استیل است.

▶ نگهداری شیر در ظروف استیل و پلاستیکی سبب کاهش ایمونوگلوبولین‌های شیرمادر می‌شود.

▶ لکوسیت‌های شیر به دیواره شیشه‌ای چسبند ولی خاصیت خود را از دست نمی‌دهند.

▶ چسبیدن و از بین رفتن لکوسیت‌ها به ظروف استیل بیشتر از ظروف شیشه‌ای است.

معافیت بهداشت



- ▶ شستشوی ظروف شیشه ای راحت تر است و اگر دیواره آن خراش نداشته باشد احتمال آسودگی میکروبی کمتر است.
- ▶ ظروف پلاستیکی بعد از چند بار مصرف و شستشو، خراش بر می دارند.
- ▶ استفاده از کیسه های پلاستیکی (پلی اتیلن) به علت:
 - امکان نشت شیر
 - خطر آسودگی
 - گرانی قیمت فقط برای مدت کوتاه (کمتر از سه روز) اشکالی ندارد ولی باید حتماً در یخچال یا فریزر گذاشته شود.
- (در یک مطالعه دیده شد آنتی بادی های شیری که در کیسه پلاستیکی نگهداری شده بود تا ۶۰ برابر کاهش داشته است).

معاونت بهداشت

توجه

بررسی های جدید نشان داده:

- ▶ چون شیر تازه دوشیده شده مادر در اتاق با دمای حداقل تا درجه حرارت ۲۵ درجه، تا ۴ ساعت سالم می ماند لذا اگر شیر دوشیده شده برای تغذیه مستمر نوزادان نارس از طریق گاواظ، ظرف ۴ ساعت مصرف شود نیازی نیست که در یخچال گذاشته شود.
- ▶ خاصیت ضد میکروبی شیر دوشیده شده در یخچال به طور چشمگیری در طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت کاهش می یابد.


نتیجه:

معافیت برقرار است

شیر دوشیده شده هر چه زودتر و تازه تر مصرف شود بهتر است.




فریز کردن شیر (۲۰ - درجه)

- 
- ❖ اگر امکان مصرف شیر دوشیده شده ظرف ۴۸ ساعت، مقدور نباشد باید آن را فریز کرد. شیرهای دوشیده شده باید جداگانه فریز شوند.
 - ❖ شیر اگر به روش مناسب فریز شود، حداقل برای مدت سه ماه قابل نگهداری است.
 - ❖ شیر را در درب فریزر نباید نگهداری کرد.
 - ❖ فریز کردن بر عکس حرارت دادن، بسیاری از مواد مغذی و ایمنی بخش شیرمادر را حفظ می کند.
 - ❖ فریزرهای نگهداری شیر باید:
 - یک ترمومتر و یک زنگ هشدار داشته باشند.
 - مکرر باز و بسته نشوند تا شیر به مدت طولانی تر یعنی حداقل ۹ ماه نگهداری شود.

نحوه ذوب کردن شیر فریزشده

به ۲ طریق است:

- 
- ۱) شب قبل، شیر فریزشده را در یخچال بگذارید تا روز بعد شیرخوار آن را به همان صورت سرد یا شیر با دمای اتاق و یا شیر گرم استفاده کند.
 - ۲) اگر می خواهید شیری را که بلافصله از فریزر خارج کرده اید استفاده کنید، آن را:
 - * زیر شیر آب گرم بگیرید.
 - * ظرف شیر را داخل یک قابلمه آب گرم گذاشته و قابلمه را روی اجاق بگذارید.

(آب قابلمه نباید به جوش بیاید بلکه تا درجه ای که شیر داخل ظرف ذوب و به حرارت مناسب برسد.)

معاونت بهداشت



توجه داشته باشید که:

- ▶ جوشاندن شیر فریز شده مجاز نیست.
- ▶ شیر فریز شده را نباید مستقیماً روی اجاق گاز و یا در مایکروویو ذوب کرد چون علاوه بر کاهش آنتی بادی های شیر، قسمت های داغ آن سبب سوزاندن دهان شیرخوار می شود.
- ▶ شیر فریز شده ای را که ذوب شده ترجیحاً ۸ ساعت و حداقل تا ۲۴ ساعت می توان در یخچال نگهداری کرد.
- ▶ شیر ذوب شده را نباید مجدداً فریز کرد.
- ▶ اگر پس از تغذیه شیرخوار، مقداری از شیر ذوب شده در ظرف، باقی ماند دیگر قابل نگهداری نیست و باید آن را دور ریخت.

تعاونت بهداشت

قبل از مصرف ، ظرف محتوی شیر را به آرامی تکان دهید تا چربی شیر که از شیر جدا شده و به صورت یک لایه سفید بالای ظرف قرار گرفته است ، مخلوط شود ولی از تکان دادن شدید آن خودداری نمائید .


در حالت عادی و به علت رژیم غذایی مادر رنگ زرد ، آبی حتی قهوه ای شیرمادر طبیعی است .

شیر فریز شده ممکن است زرد رنگ شود که نشانه آلودگی نیست مگر این که بو و طعم آن تغییر کرده باشد .

برخی اوقات شیر فریز شده بعد از ذوب شدن بوی صابون می دهد که به دلیل تغییرات چربی شیر است. اگر شیرخوار آن را می پذیرد، استفاده از آن اشکالی ندارد.

معاونت بهداشت

تمیز کردن ظروف جمع آوری شیر

- 
- ❖ شیر باقی مانده در ظرف را دور بریزید.
 - ❖ ظرف را با آب داغ و صابون بشویید.
 - ❖ خوب آبکشی کنید.
 - ❖ بگذارید در هوا خشک شود.

معاونت بهداشت

دوشیدن و نخیره کردن شیرمادر برای نوزادان نارس

معاونت بهداشت

چرا استفاده از شیرمادر برای نوزادان نارس جیاتی است؟

- ▶ با کاهش عفونت‌ها و بیماری‌های التهابی همراه است.
- ▶ تکامل عصبی و الگوی مناسب رشد را فراهم می‌کند.
- ▶ در برقراری تغذیه دهانی تسريع می‌شود.
- ▶ سبب تقویت سیستم ایمنی، و
- ▶ ایجاد روابط عاطفی مناسب مادر و نوزاد می‌گردد.

AAP توصیه

همه شیرخواران نارس باید با شیرمادر خودشان تغذیه شوند و در صورت عدم دسترسی به شیرمادر، **شیر‌های اهدایی پاستوریزه شده سایر مادران** بهتر از تغذیه با فرمولاهای تهیه شده برای نوزادان نارس است.

مشکلات مادران دارای نوزاد نارس

نگرانی و اضطراب مادر:

توقف رفلکس جاری شدن شیر \leftarrow کاهش تولید شیر \leftarrow حجم ناکافی شیر

بنابراین:

در مقایسه با مادران دارای نوازد رسیده :

- میزان شروع شیردهی کمتر
- تداوم شیردهی کمتر

و چون:

- ▶ اطلاعات کافی از فواید شیرشان برای نوزاد نارس ندارند،
- ▶ این باور نادرست که مزیت شیرمادر و شیر مصنوعی یکسان است،
- ▶ الگوی مناسبی در خانواده نداشته و یا از طرف خانواده و پرسنل پزشکی حمایت کافی نمی شوند،
- ▶ برخی پزشکان شیر مصنوعی را توصیه می کنند (بدون اینکه ضرورت داشته باشد)،

لذا: مادران نیز به استفاده از شیر مصنوعی تمایل پیدا می کنند.

راه کار عملی چیست؟

- ▶ اگر به هر دلیلی مادر نتواند به نوزادش مستقیماً از پستان شیر بدهد: هرچه زودتر و در همان ۶ ساعت اول پس از تولد باید شیرش را بدوشد.



مطالعات نشان داده:

دوشیدن زودهنگام و مکرر دوشیدن شیر سبب:

- ▶ افزایش طول مدت شیردهی
- ▶ افزایش حجم شیر در دو هفتگی
- ▶ افزایش بعدی تولید شیر می شود.

معاونت بهداشت

روش دوشیدن آغوز

بعد از تولد به علت غلیظ بودن آغوز و حجم کم آن (گرچه حجم آغوز کم است ولی برای نوزاد کافی است)؛
دوشیدن آغوز با دست نسبت به دوشیدن شیر با پمپ الکتریکی مؤثرer است.

دفعات دوشیدن

مانند شیرخواران ترم :

۸ تا ۱۲ بار در شبانه روز
کلاً ۱۰۰ دقیقه در روز و حداقل ۱ بار در شب با پمپ (شیردوش)
(برای هر مادر و بر اساس شرایط او متفاوت است)

طول زمان دوشیدن

روزهای اول: هر بار ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
بعد از جاری شدن شیر: علاوه بر زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، مدت دو دقیقه هم
پس از خروج آخرین قطرات شیر دوشیدن باید ادامه داشته باشد.

برای تولید و تداوم شیر برای یک نوزاد نارس بستره:

- * هرچه زودتر پس از تولد او شروع به دوشیدن شیر کنید (ترجیحاً در شش ساعت اول تولد)
- * دوشیدن را حداقل را ۸ بار در ۲۴ ساعت تکرار کنید.

وقتی جریان شیر کاملاً برقرار شد:

- دفعات دوشیدن را کاهش دهید.
- این زمان معمولاً "۲ تا ۳ هفته بعد از تولد است
- یا وقتی است که تولید شیر به ۰.۵ میلی لیتر در ۲۴ ساعت می‌رسد.

معاونت بهداشت

توجہ

- ▶ حداکثر میزان تولید شیر هنگامی است که پستان از شیر تخلیه شود.
 - ▶ هم طول زمان هر نوبت دوشیدن شیر و هم فاصله بین دو نوبت دوشیدن شیر در مادران مختلف متفاوت است.
 - ▶ با توجه به خصوصیات هر مادر بهتر است ترتیبی داده شود که تولید شیر مادر به حداکثر و در نهایت زمان دوشیدن شیر به حداقل برسد.
 - ▶ جهش رشد در روزهای ۱۰ تا ۱۶ تولد در نوزاد نارس مانند نوزاد ترم است.

٦٣

- ▶ دفعات شیردادن و دفعات دوشیدن شیر باید افزایش داشته باشد.
 - ▶ جمع آوری آخرین قطرات شیر که چربی بیشتر و نتیجه کالری بیشتری دارد برای نوزاد نارس، حپاگی و ضروری است.

استفاده و نگهداری از شیر دوشیده شده برای نوزاد نارس

شیر تازه دوشیده شده نسبت به شیر دوشیده شده و نگهداری شده در یخچال ارجح است (نوزاد نارس بهتر وزن می‌گیرد).

- نگهداری شیر تازه در اتاق با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۴ ساعت
- در یخچال ۴۸ ساعت
- شیر فریز شده ذوب شده در یخچال حداقل ۱۲ ساعت
- مصرف شیر ذوب شده در دمای اتاق حداقل یک ساعت

معاونت بهداشت



از توجه شما سپاسگزاریم



معاونت بهداشت